


EL USO DE ALCOHOL Y DROGAS

UN FACTOR IMPORTANTE EN EL RIESGO DE CONTRAER EL VIH

Un tercio de los 1.2 millones de americanos con VIH usan drogas o toman alcohol en exceso. Muchas personas no saben que el peligro de contraer VIH entre las personas que usan sustancias puede ser el resultado de **DOS** puntos en especial, primero por compartir los utensilios que se usan para inyectar drogas y segundo por no poder tomar decisiones sensatas lo cual puede terminar en comportamientos sexuales riesgosos y la transmisión del VIH. Por esta razón recibir tratamiento para el abuso de sustancias puede jugar una parte muy importante en prevenir la transmisión del VIH.


1.2 MILLONES DE PERSONAS EN LOS ESTADOS UNIDOS VIVEN CON VIH¹

DEL 2005 AL 2009, **1 DE CADA 3**
PERSONAS CON VIH USABAN ALGUNA
DROGA O BEBÍAN ALCOHOL EN EXCESO.²



EL USO DE ALCOHOL Y
DROGAS ESTÁ VINCULADO
CON EL USO DE CONDONES
CON MENOS FRECUENCIA.³

INCIDENCIA DEL VIH POR TRANSMISIÓN, 2010¹



24%

DE LAS PERSONAS CON
VIH NECESITAN TRATAMIENTO PARA
EL ABUSO DE SUSTANCIAS²